

ДІАБЕТИЧНА РЕТИНОПАТІЯ

Заргорян В.В., студ. 5-го курсу

Науковий керівник – асист. Басанец С.Н.

*СумДУ, медичний інститут, кафедра ортопедії, травматології
і невідкладних станів, курс офтальмології*

Діабетична ретинопатія є одним із проявів універсальної діабетичної мікроангіопатії та основною причиною сліпоти. Частота виникнення діабетичної ретинопатії зростає пропорційно до тривалості цукрового діабету, патологічні зміни на сітківці виникають уже 5-7 років після початку захворювання. Діабетична ретинопатія після 10-річної тривалості цукрового діабету зустрічається у 50%, а після 15-річної – у 80% таких хворих. У дітей діабетична ретинопатія також має місце і особливо прогресує в пубертатний період. Згідно даної класифікації розрізняють такі основні стадії діабетичної ретинопатії: непроліферативна ретинопатія, передпроліферативна ретинопатія, проліферативна ретинопатія. Діагностика діабетичної ретинопатії. Перше обстеження у окуліста хворий повинен пройти через 1,5-2 роки встановлення діагнозу “Цукровий діабет”. Методи обстеження органу зору: зовнішній огляд очного яблука, визначення гостроти зору, визначення полів зору, обстеження рогівки, райдужної оболонки, кута передньої камери ока.