

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Шкрьоба А. О.

*Науковий керівник – д-р мед. наук, проф. А. М. Романюк
СумДУ, кафедра патоморфології*

Рак передміхурової залози займає друге місце серед причин смерті у чоловіків від пухлинних процесів.

Мета: Вивчити роль екзогенних (екологічних, соціально-гігієнічних, індивідуальних) чинників у виникненні раку передміхурової залози на території Сумської області.

Матеріали і методи дослідження: Було використано дані захворюваності на рак передміхурової залози Сумського обласного онкологічного диспансеру за 2008-2011 роки та звіт Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області. Проведено аналіз коливання показників захворюваності раком передміхурової залози в районах Сумської області залежно від екологічної ситуації в них.

Результати дослідження: На території Сумської області основними екзогенними факторами, що значимо підвищують ризик розвитку раку передміхурової залози, є професійні впливи, куріння, систематичне вживання алкоголю, перенесені запальні захворювання статевих органів. Найбільш високий рівень захворюваності на рак передміхурової залози спостерігається в Недригайлівському, Білопільському, Тростянецькому, Путивльському районах та у м. Суми. Також виявлено значне коливання рівнів захворюваності РПЗ у різних районах області.

Висновки: Захворюваність на рак передміхурової залози у населення Сумської області дуже часто пов'язана з несприятливими екологічними чинниками.