

КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ БЕШИХИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Гавриленко І. О., Олейніченко Ж. М.

Науковий керівник - к. мед. наук, доц. Захлебаєва В. В.

СумДУ, кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

Актуальність. У час розквіту медичної науки та впровадження сучасних антибактеріальних препаратів частота реєстрації випадків захворювання на бешиху продовжує займати вагоме місце серед іншої інфекційної патології. Хвороба, як і раніше, характеризується схильністю до розвитку частих рецидивів, що призводить до тривалої непрацездатності пацієнтів.

Мета роботи. Вивчити особливості клінічного перебігу бешихи на сучасному етапі та дослідити фактори ризику.

Результати досліджень. Проведено клініко-статистичний аналіз результатів лікування 59 хворих на первинну, повторну та рецидивну бешиху, які перебували на стаціонарному лікуванні з 01.01.2012 по 31.10.2012 року у Сумській обласній клінічній інфекційній лікарні ім. З. Й. Красовицького. Оцінювалися наступні параметри: вік, стать, клінічна форма, а також фактори ризику.

Середній вік пацієнтів склав ($54,8 \pm 5,4$) року. Переважали особи жіночої статі – 37 (62,7 %), чоловіків було – 22 (37,3 %). Локалізація місцевого процесу переважно була на нижніх кінцівках – 53 (89,8%) хворих, у 5 (8,6 %) - на обличчі, і лише у 1 (1,6 %) – на тулубі. У 37 (62,7 %) пацієнтів діагностувалася первинна бешиха, у 18 (30,5 %) - рецидивна, у 4 (6,8 %) - повторна. За характером місцевих проявів у більшості хворих (44, 74,5 %) спостерігалась еритематозна форма захворювання, у 7 (11,8 %) – еритематозно-бульозна форма, у 3 (5,3 %) – еритематозно-геморагічна форма. Бульозно-геморагічна форма була виявлена у 5 (8,4 %) осіб. Серед факторів ризику частіше зустрічалися: мікротравми, переохолодження, нервово-емоційні перевантаження та ГРЗ. Фонові супутні захворювання спостерігались у людей з рецидивною формою бешихи (18-30,5 %) переважно при первинному захворюванні (15 – 24,4 %).

Висновок. На бешиху частіше хворіють особи жіночої статі старше 40 років. Переважно реєструється первинна бешиха. Для сучасної бешихи характерна локалізація процесу в основному на нижніх кінцівках. Серед клінічних форм переважає еритематозна форма захворювання. Факторами ризику розвитку бешихи та її рецидивів є мікротравми, переохолодження, нервово-емоційні перевантаження та ГРЗ.