

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ БРОНХІТІВ У ДІТЕЙ РАНЬОГО ВІКУ

*Сміян О.І., професор; Гринишин В.В., студ. 6-го курсу
СумДУ, медичний інститут, кафедра педіатрії післядипломної освіти
з курсами пропедевтичної педіатрії і дитячих інфекцій*

На сьогоднішній день однією зі складних проблем у тактиці лікування запальних процесів дихальних шляхів слід визначити питання про призначення і доцільність антибактеріальної терапії.

На даний час доведено, що в етіологічній структурі захворювань дихальних шляхів переважає вірусна інфекція, зокрема в 85-90% дітей гострі бронхіти зумовлені вірусами, в 5-7% - атиповими збудниками і лише в 5-10% - бактеріальною мікрофлорою.

На жаль, незважаючи на переважно вірусну природу захворювання, антибактеріальна терапія гострих бронхітів проводиться необґрунтовано широко. Навіть, беручи до уваги отримані в клінічних дослідженнях переконливі докази відсутності ефекту від антибіотиків, як щодо тривалості перебігу захворювання, так і щодо вираженості симптоматики і профілактики бактеріальних ускладнень.

Широке недоцільне застосування антибактеріальних препаратів спричиняє збільшення тривалості захворювання, появу резистентних штамів збудника, підвищується ризик виникнення побічних реакцій (алергія, шлункові-кишкові розлади, дисбактеріоз).

Показами до призначення антибактеріальної терапії є наявність виражених симптомів інтоксикації, клінічні ознаки, що вказують на бактеріальну природу процесу (слизово-гнійний і гнійний характер харкотиння), бронхообструкція, довготривала гіпертермія (більше 3 днів), затяжний перебіг захворювання, а також діти з несприятливим преморбідним фоном, що може створити загрозу розвитку пневмонії.

Таким чином, у даний час лікування гострого бронхіту в дітей раннього віку полягає в мінімізації використання антибіотиків, а їх застосування рекомендується тільки за чіткими показами й з урахуванням особливостей перебігу кожного випадку захворювання.