



**ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ (БА) ПРИ
КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІКУВАЛЬНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗУ (ЛП)**

Любчак В.В., аспірант

*Науковий керівник – проф. кафедри інфекційних хвороб,
зав. курсом мікробіології, вірусології, імунології*

СумДУ Каплін М.М.

Імунна система являє собою сукупність лімфоїдних органів, які не мають анатомічного зв'язку, але злагоджено працюють за рахунок рухомих клітин, медіаторів і інших факторів. Кров також відноситься до периферичних органів і від її складу залежить стан імунної системи. При аналізі кількості і активності Т-лімфоцитів (СД-3), Т-хелперів (СД-4), Т-супресорів (СД-8) у хворих БА до і після проведення лікувального плазмаферезу (ЛП) у 24 хворих ми одержали результати, які відображені на графіку.



Таким чином, з приведених даних можна зробити висновок, що лікувальний плазмаферез не тільки оновлює склад крові, в тому числі і лімфоцити, а й підвищує їх активність і в цілому підвищує клітинний імунітет.