

ТУБЕРКУЛЬОЗ У СТРУКТУРІ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИХ РОЗТИНІВ

*Корнієнко М.О., Опанасенко О.П., студ.3-го курсу
Науковий керівник – асист. Л.І. Карпенко
СумДУ, кафедра патологічної анатомії*

Туберкульоз за визнанням провідних вчених продовжує залишатись глобальною проблемою у світі. За прогнозами ВООЗ на протязі поточного 10-річчя у світі передбачається 90 млн. нових випадків туберкульозу (Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г., Панасюк О.В. 1998).

Актуальна на сьогодні проблема туберкульозу і у Сумській області, про що зокрема свідчить аналіз динаміки окремих статистичних показників діяльності обласної патологоанатомічної служби за останні 5 років.

В загальній нозології патологоанатомічних розтинів померлих в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів області серед дорослого населення питома вага розтинів померлих від інфекційної патології за аналізуємий період зростає з 7,0 до 9,0% (Україна – 8,1%), з піком підйому у 2000 році до 9,8%.

В структурі патологоанатомічних розтинів померлих від інфекційних хвороб переважну більшість становили розтини померлих від туберкульозу органів дихання з тенденцією до зростання їх питомої ваги (з 85,8% у 1997р. до 89,6% у 2001р.). Відмічалась вища смертність від туберкульозу серед чоловіків (93,52%). Більший відсоток серед померлих становили жителі сільської місцевості (73,74%). Померлі від туберкульозу переважно були у віці від 30 до 60 років. Серед них працюючі хворі становили лише 6,67%. Дисемінований і фіброзно-кавернозний туберкульоз становили 88,23%.

Викладене дає підстави для подальшого вирішення, поряд з соціально-медичними аспектами, також і проблеми підвищення рівня соціальної захищеності медичного персоналу патологоанатомічних підрозділів на державному рівні.